

**ORDONNANCE
INDIVIDUELLE
(O.I.)**

INITIATION DE SÉDATION ET ANALGÉSIE POSTINTUBATION À L'URGENCE – CLIENTÈLE ADULTE ET PÉDIATRIQUE		CODE : O.I. 21
POIDS ¹ _____ TAILLE : _____ m SURFACE CORPORELLE : _____ m ² ALLERGIE : _____		ACCEPTÉE PAR : Comité de pharmacologie le : 2012-12-04 Exécutif du CMDP le : 2013-01-17 Exécutif du CII le : 2012-12-10 RÉVISÉE LE :
DATE (AAAA/MM/JJ) HEURE (HH:MM)	MÉDICAMENTS, DOSE, POSOLOGIE, VOIE D'ADMINISTRATION	INF.
	Généralités :	
	- Durant la période d'utilisation de l'ordonnance, seuls les narcotiques et les sédatifs prescrits par le médecin responsable de l'utilisateur doivent être administrés.	
	- L'ajustement du débit des perfusions selon l'écart inscrit et des bolus doit se faire sous ordonnance médicale verbale ou écrite en fonction de l'état de l'utilisateur.	
	SÉDATION	
	<input type="checkbox"/> Midazolam 1 mg/ml pour perfusion ² IV (Dose suggérée : 0,02 à 0,1 mg/kg/h) Voir tableau de perfusion	
	Débuter la perfusion ² IV à _____ mg/kg/h, soit _____ mg/h (_____ ml/h)	
	<input type="checkbox"/> Bolus (0,05 mg à 0,1 mg/kg) : _____ mg IV q _____ minutes PRN si agitation (Max. : ____ doses)	
	<input type="checkbox"/> Propofol 10 mg/ml (Dose suggérée : 0,3 à 3 mg/kg/h) Voir tableau de perfusion	
	Débuter la perfusion ² IV à _____ mg/kg/h	
	<input type="checkbox"/> Bolus (0,5 à 1 mg/kg, diminuer de 20 à 30 % si personnes âgées) : _____ mg IV q _____ minutes PRN si agitation (Max. : _____ doses)	
	ANALGÉSIE	
	<input type="checkbox"/> Morphine 1 mg/ml pour perfusion ² IV (Dose suggérée : 0,05 à 0,15 mg/kg/h) Voir tableau de perfusion	
	Débuter la perfusion ² IV à _____ mg/kg/h, soit _____ mg/h (_____ ml/h)	
	<input type="checkbox"/> Bolus de départ (adultes (2,5 mg à 10 mg), enfant : 0,05 à 0,15 mg/kg) : _____ mg IV lent à 3 mg/min	
	<input type="checkbox"/> Bolus subséquents selon évaluation médicale	
	<input type="checkbox"/> Fentanyl 5 mcg/ml pour perfusion ² IV (Dose suggérée : 0,5 à 1,5 mcg/kg/h) Voir tableau de perfusion	
	Débuter perfusion ² IV à _____ mcg/kg/h, soit _____ mcg/h	
	<input type="checkbox"/> Bolus de départ (0,5 à 2 mcg/kg) : _____ mcg IV lent sur 2 minutes	
	<input type="checkbox"/> Bolus subséquents selon évaluation médicale	
	<input type="checkbox"/> Autre :	

Date : _____ Signature du médecin : _____ Signature de l'infirmière : _____

DSI\Ordonnances individuelle\O.I. 21 Initiation de sédation et analgésie postintubation à l'urgence.docx

¹ PCI = Poids corporel idéal; PCA = Poids corporel ajusté
Si obésité morbide (poids total est supérieur de 25 % du PCI), certains auteurs recommandent d'utiliser le PCA.
Calcul du PCI :

PCI (kg, hommes) : 50 + (2,3 x nombre de pouces au-dessus de 5 pieds).

PCI (kg, femmes) : 45,5 + (2,3 x nombre de pouces au-dessus de 5 pieds).

Calcul du PCA = PCI + 0,4 x (poids corporel total - PCI)

² Se référer à la fiche du Manuel de pharmacothérapie parentérale