

ORDONNANCE COLLECTIVE	Code : GMF-OC-ÉPI-01 Date d'émission originale: 2021-10-06 Date de révision prévue : 2024-10-06	
	Référence à un protocole OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> GMF-PRO-ÉPI-01 Initier l'administration de l'épinéphrine lors d'une réaction allergique de type anaphylactique	
Objet : Initier l'administration de l'épinéphrine lors d'une réaction allergique de type anaphylactique		
	Version antérieure	Dernière version
Recommandée par Les médecins du GMF		2022-04-06
Adoptée par Les médecins du GMF		2022-04-06

PROFESSIONNEL(S) AUTORISÉ(S)

Les Infirmières du GMF qui possèdent la compétence professionnelle requise, c'est-à-dire les connaissances scientifiques, les habilités et le jugement clinique inhérent à l'activité exercée.

DIRECTIONS PROGRAMMES ET SECTEURS D'ACTIVITÉS VISÉS

GMF _____

SITUATION CLINIQUE OU CLIENTÈLE

Tout usager présentant les signes et symptômes d'une réaction allergique de type anaphylactique.

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE VISÉE

- Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique;
- Effectuer et ajuster les traitements médicaux, selon une ordonnance;
- Administrer et ajuster des médicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance.

INDICATIONS

Réaction grave d'hypersensibilité immédiate pouvant mener à la mort en l'absence de prise en charge.

INTENTION OU CIBLE THÉRAPEUTIQUE

Contrôler et limiter l'aggravation des symptômes d'hypersensibilité.

CONTRE-INDICATIONS

Il n'y a pas de contre-indication absolue à l'utilisation de l'épinéphrine dans une situation d'allergie potentiellement mortelle.

PROTOCOLE MÉDICAL OU RÉFÉRENCE À UN PROTOCOLE MÉDICAL EXTERNE

Référer au protocole médical : GMF-PRO-ÉPI-01 *Administrer de l'épinéphrine lors d'une réaction allergique de type anaphylactique.*

LIMITES OU SITUATIONS EXIGEANT UNE CONSULTATION MÉDICALE OBLIGATOIRE

Aucune.

COMMUNICATION AVEC LE MÉDECIN TRAITANT

Après l'administration de l'épinéphrine, l'usager doit faire l'objet d'une consultation urgente avec un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée.

OUTILS DE RÉFÉRENCE, SOURCES ET EXPERTS CONSULTÉS

Balan, H., Gurghean A. (2015). *Anaphylactic Shock : are we doing enough and with the right timing and order?* Rom. J. Intern. Med., 53 (3) : 191-198.

Centre de santé et de services sociaux de Québec-Nord. (2013). Règle de soins : Administrer de l'épinéphrine lors d'un choc anaphylactique. Document interne.

Lexi-Drugs. (2018). *Epinephrine (Systemic)*. Consulté en ligne le 11 mai 2018 via la Bibliothèque de l'Université Laval. IBM Micromedex. (2018). *Anaphylaxis, Drug therapy*. Consulté en ligne le 11 mai 2018 via la Bibliothèque de l'Université Laval.

Pfizer. (2020). Renseignements posologiques EpiPen, Épinéphrine stérile injectable USP (monographie du produit). Consulté sur le web le 18 novembre 2020 à l'adresse suivante : https://www.pfizer.ca/sites/default/files/202011/EPIPEN_PM_F_22Sep2020.pdf

Programme d'Immunisation du Québec (PIQ). Section *Urgences liées à la vaccination*. Consulté en ligne le 24 octobre 2019 : <https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-urgences-liees-a-la-vaccination/>

UpToDate. (2020). *Anaphylaxis : Acute diagnosis*. Consulté le 10 décembre 2020.

UpToDate. (2020). *Anaphylaxis : Emergency treatment*. Consulté le 10 décembre 2020.

UpToDate. (2020). *Pathophysiology of anaphylaxis*. Consulté le 10 décembre 2020.

IDENTIFICATION DU MÉDECIN PRESCRIPTEUR

Médecins signataires du GMF.

IDENTIFICATION DU MÉDECIN RÉPONDANT

Médecins signataires du GMF.

VALIDATION DE L'ORDONNANCE COLLECTIVE

Valide 36 mois.

