

## ORDONNANCE COLLECTIVE

Code : GMF-OC-NERV-02

Date d'émission originale: 2020-12-02

Date de révision prévue : 2023-12-02

Référence à un protocole

OUI  NON

GMF-PRO-NERV-02 Initier l'administration de dimenhydrinate pour la prévention et le soulagement des nausées ou des vomissements

**Objet : Initier l'administration de dimenhydrinate pour la prévention ou le soulagement des nausées ou des vomissements**

	Version antérieure	Dernière version
<b>Recommandée par</b> Équipe interprofessionnelle GMF		2020-
<b>Adoptée par</b> Médecin responsable du GMF		2020-

### PROFESSIONNEL(S) AUTORISÉ(S)

Les infirmières du GMF qui possèdent la compétence professionnelle requise, c'est-à-dire les connaissances scientifiques, les habilités et le jugement clinique inhérent à l'activité exercée.

### DIRECTIONS PROGRAMMES ET SECTEURS D'ACTIVITÉS VISÉS

GMF \_\_\_\_\_

### SITUATION CLINIQUE OU CLIENTÈLE

Usager de 2 ans ou plus présentant ou susceptible de présenter des nausées ou des vomissements.

### ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE VISÉE

- Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique;
- Administrer et ajuster des médicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance.

### INDICATIONS

Présence ou possibilité de présenter :

- Des nausées;
- Des vomissements.

### INTENTION OU CIBLE THÉRAPEUTIQUE

Prévenir ou soulager:

- Les nausées;
- Les vomissements.

### CONTRE-INDICATIONS

Allergie ou hypersensibilité au dimenhydrinate ou à l'une des composantes du produit.

### PROTOCOLE MÉDICAL OU RÉFÉRENCE À UN PROTOCOLE MÉDICAL EXTERNE

Se référer au protocole médical : **GMF-PRO-NERV-02** Initier l'administration de dimenhydrinate pour la prévention ou le soulagement des nausées ou des vomissements.

## LIMITES OU SITUATIONS EXIGEANT UNE CONSULTATION OBLIGATOIRE AUPRÈS D'UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ

---

Avant d'initier l'ordonnance collective, l'infirmière doit consulter le médecin ou l'infirmière praticienne spécialisée dans les situations suivantes:

- Céphalée importante, suspicion de migraine;
- Douleur rétro-sternale;
- Suspicion d'occlusion intestinale;
- Vomissements fécaloïdes ou sanguinolents;
- Hypertrophie bénigne de la prostate mal contrôlée;
- Rétention urinaire ou histoire de rétention urinaire, sauf chez l'utilisateur porteur d'une sonde urinaire;
- Grossesse;
- Histoire de glaucome à angle étroit ou glaucome non spécifié;
- Histoire récente d'impact crânien;
- Risque élevé de chutes;
- Utilisation de 4 doses de dimenhydrinate dans les dernières 24h.
- Fièvre, diminution de l'état général\*;
- Douleur abdominale\*;
- Nausées ou vomissements persistants plus de 24h\*;
- Usager hémodialysé se référer à l'ordonnance collective disponible à cet effet.

\* Lorsque l'infirmière suspecte que ces signes et symptômes sont reliés à un épisode de gastro-entérite, une première dose de dimenhydrinate pourrait être administrée sans discussion préalable avec le médecin ou l'IPS. Cependant, l'efficacité du dimenhydrinate étant limitée en présence de gastro-entérite, l'infirmière devrait discuter avec le médecin traitant ou l'IPS avant d'administrer toute dose supplémentaire.

### Particularités

- Pour l'utilisateur suivi en oncologie, l'infirmière doit se référer à l'équipe spécialisée ou au médecin traitant.
- L'administration de certains médicaments par la voie rectale peut être contre-indiquée, par exemple chez les usagers immunosupprimés ou ayant subi une chirurgie rectale récente. Se référer à la méthode de soins infirmiers au besoin.

## COMMUNICATION AVEC LE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ TRAITANT

---

Le médecin traitant ou l'IPS devrait être informé que l'utilisateur a eu un épisode de nausées ou de vomissements, soulagé ou non par l'administration de dimenhydrinate.

Chez les personnes âgées, les personnes fragiles et les usagers polymédicamentés, les nausées et les vomissements peuvent être reliés à la médication. Il est alors utile d'aviser un pharmacien afin d'effectuer une révision de la pharmacothérapie.

## OUTILS DE RÉFÉRENCE, SOURCES ET EXPERTS CONSULTÉS

---

Lexi-Drugs (2019). Dimenhydrinate (Lexi-Drugs), consulté en ligne via la bibliothèque de l'Université Laval, avril 2019.

IBM Micromedex (2019). Dimenhydrinate, consulté en ligne via la bibliothèque de l'Université Laval, avril 2019. RxVigilance 3.0.18 (2019). Dimenhydrinate, monographie.

## IDENTIFICATION DU MÉDECIN PRESCRIPTEUR

---

Médecins signataires du GMF

## IDENTIFICATION DU MÉDECIN RÉPONDANT

---

Médecins signataires du GMF

**Approbation médicale pour l'ordonnance collective « GMF-OC-NERV-02 »**

**GMF** \_\_\_\_\_

<b>NOM, PRÉNOM</b>	<b>NO DE PERMIS</b>	<b>SIGNATURE</b>	<b>DATE</b>	<b>TÉLÉPHONE</b>