



Suivons le guide !

Fiche synthèse

GESTION DES MÉDICAMENTS

Février 2024

LIMITER LES FORMULATIONS D'OPIOIDES À CONCENTRATION ÉLEVÉE ET À DOSE TOTALE ÉLEVÉE



Pourquoi une «POR» pour limiter les formulations d'opioïdes à concentration élevée et à dose totale élevée ?

Les narcotiques font partie de la catégorie des médicaments de niveau d'alerte élevé, c'est-à-dire qu'ils comportent un risque élevé de causer des préjudices graves à l'utilisateur s'ils sont administrés par erreur (erreur de dose ou d'usager).

Stratégies préventives pour diminuer le risque :

- On doit limiter au minimum la disponibilité de ces médicaments sur les unités de soins;
- Que ce soit pour le service, la réception, l'administration ou la destruction, toujours se référer à la [procédure sur les stupéfiants, drogues contrôlées et substances ciblées](#);
- Un décompte de tous les médicaments contrôlés, doit être fait à chaque quart de travail;
- L'accès aux réserves de narcotiques doit être limité et s'il y a lieu, la clé de l'armoire de narcotiques doit être en tout temps en possession de l'infirmière;
- Avant l'administration de ces médicaments, le personnel doit **absolument** procéder à la **DOUBLE VÉRIFICATION INDÉPENDANTE (DVI)** (Se référer à la [procédure de médicament de niveau d'alerte élevé](#) en vigueur);
- Des mesures particulières sont prises pour les narcotiques à « **HAUTE CONCENTRATION** »



Narcotiques à HAUTE CONCENTRATION

Dans les établissements du CIUSSS de la Capitale Nationale, nous considérons les narcotiques suivants comme étant à haute concentration :

- ⇒ **Hydromorphone (Dilaudid) injectable** dont la dose est **supérieure à 2mg** par contenant (ex. : hydromorphone HP 10mg/ml et HP 50mg/ml);
- ⇒ **Morphine injectable** dont la dose totale est **supérieure à 15mg** par contenant (ex. : morphine HP 50mg/ml);
- ⇒ **Fentanyl injectable** dont la dose totale est **supérieure à 100mcg** par contenant;
- ⇒ **Sufentanil injectable 50mcg/ml**;
- ⇒ **Kétamine injectable 50mg/ml**;
- ⇒ **Méthadone 10mg/ml** solution orale;
- ⇒ **Cannabis suspension** de toutes concentrations.



Stratégies préventives pour diminuer le risque lié aux narcotiques à haute concentration :

- Excepté pour les besoins ciblés de certaines unités critiques, la pharmacie distribue ces narcotiques sur réception d'une ordonnance seulement;
 - Ceux-ci ne doivent pas être gardés sur les unités de soins, **sauf** s'ils sont identifiés par la pharmacie au nom de l'utilisateur;
 - La pharmacie appose l'étiquette suivante sur le médicament
- HAUTE CONCENTRATION**
À retourner à la pharmacie
dès que n'est plus requis
- La pharmacie retire ces médicaments de l'unité lorsque l'ordonnance est cessée ou que l'utilisateur quitte;
 - La pharmacie valide régulièrement les stupéfiants de haute concentration qui sont en circulation sur les unités de soins, elle vérifie que l'ordonnance est encore active au dossier pour s'assurer du retour du produit lorsque l'utilisateur a quitté ou lorsque l'ordonnance est cessée.

Aviser la pharmacie si vous avez un de ces narcotiques non identifié au nom de l'utilisateur.

Quoi faire si l'ordonnance est cessée ou que l'utilisateur quitte?

Aviser la pharmacie le plus tôt possible pour retirer le produit.

