

ORDONNANCE COLLECTIVE	Code : GMF-OC-OSTEO-02 Date d'émission originale: 2020-12-02 Date de révision prévue : 2023-12-02	
	Référence à un protocole OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> GMF-PRO-OSTEO-02 Initier une mesure diagnostique de radiologie (radiographie de la clavicule, de l'épaule, de l'humérus, du coude, de l'avant-bras, du poignet, de la main ou du doigt) chez l'utilisateur ambulateur présentant un traumatisme au membre supérieur	
Objet : Initier une mesure diagnostique de radiologie (radiographie de la clavicule, de l'épaule, de l'humérus, du coude, de l'avant-bras, du poignet, de la main ou du doigt) chez l'utilisateur ambulateur présentant un traumatisme au membre supérieur		
	Version antérieure	Dernière version
<u>Recommandée par</u> Équipe interprofessionnelle du GMF		2020-
<u>Adoptée par</u> Médecins signataires		2020-

PROFESSIONNEL(S) AUTORISÉ(S)

Les infirmières du GMF qui possèdent la compétence professionnelle requise, c'est-à-dire les connaissances scientifiques, les habilités et le jugement clinique inhérent à l'activité exercée.

DIRECTIONS PROGRAMMES ET SECTEURS D'ACTIVITÉS VISÉS

GMF _____

SITUATION CLINIQUE OU CLIENTÈLE VISÉE

L'utilisateur ambulateur de 18 ans qui présente un traumatisme au membre supérieur (clavicule, épaule, humérus, coude, avant-bras, poignet, main ou doigt).

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE VISÉE

- Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique;
- Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques selon une ordonnance.

INDICATIONS

Demander une radiographie des membres ci-dessous seulement si :

Histoire de traumatisme récent (moins de 7 jours)

- **Inclusion** : coup, écrasement, lacération, chute, etc.
- **Exclusion** : mouvements répétitifs, surutilisation, œdème d'origine inconnue.

ET

Douleur osseuse au site de la blessure soit : à la clavicule, à l'épaule, à l'humérus, au coude, à l'avant-bras, au poignet, à la main ou au doigt.

INTENTION OU CIBLE THÉRAPEUTIQUE

- Détecter des lésions osseuses traumatiques (fractures);
- Éliminer la possibilité d'une fracture;
- Accélérer le processus d'évaluation avant la prise en charge médicale.

CONTRE-INDICATIONS

- Usager de moins de 18 ans;
- Femme enceinte.

PROTOCOLE MÉDICAL OU RÉFÉRENCE À UN PROTOCOLE MÉDICAL EXTERNE

Se référer au protocole médical: **GMF-PRO-OSTEO-02** « Initier une mesure diagnostique de radiologie (radiographie de la clavicule, de l'épaule, de l'humérus, du coude, de l'avant-bras, du poignet, de la main ou du doigt) chez l'usager ambulatoire présentant un traumatisme au membre supérieur ».

LIMITES OU SITUATIONS EXIGEANT UNE CONSULTATION MÉDICALE OBLIGATOIRE

Diriger vers le médecin de garde si l'usager présente :

- Une altération de l'état de conscience rendant l'évaluation impossible;
- Une atteinte neurovasculaire en aval de la région atteinte;
- Une fracture ouverte;
- Un Polytraumatisme;
- Un usager qui revient pour une réévaluation de la même blessure;
- Un Traumatisme à la colonne cervicale;
- Une histoire de maladie chronique orthopédique;
- Un traumatisme suggérant de la maltraitance;
- Une femme enceinte ou croyant l'être.

COMMUNICATION AVEC LE MÉDECIN TRAITANT

La radiographie est conditionnelle à la visite médicale. Aviser l'usager des délais d'attente et prescrire la radiographie seulement si l'usager est en mesure de rester pour consultation médicale.

OUTILS DE RÉFÉRENCE, SOURCES ET EXPERTS CONSULTÉS

Jeffery Hale, Saint Brigid's(2014), Demander une radiographie osseuse. OC 2014-11-27-016.

Centre de santé et de services sociaux de Maskinongé, Initier une radiographie des membres suivants : clavicule, épaule, humérus, coude, avant-bras, poignet, main, doigt, fémur, jambe et orteil. (2003).

Centre de santé et de services sociaux du Granit, demander une radiographie d'un membre supérieur (humérus, coude, avant-bras, poignet, main, doigt).OC-0044.

Centre de santé et de services sociaux de Québec-Nord, Demander une radiographie du coude. (2014).

Centre de santé et de services sociaux de Québec-Nord, Demander une radiographie des doigts, de la main, du poignet, de l'avant-bras, des orteils ou de la jambe (exclusion : coude, genou, cheville et pied) (2014).

Doyon, O., Longpré, S. et al. (2016). *Évaluation clinique d'une personne symptomatique*. Éditions du renouveau pédagogique inc. 868 pages.

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (2019). *Le triage à l'urgence. Lignes directrices pour l'infirmière au triage à l'urgence*. 40 pages.

